


Ulostenäyte helikobakteerin osoittamiseksi (F –HepyAg)

Tietyt lääkeaineet saattavat vaikuttaa testin tulokseen. Seuraavia lääkkeitä ei saisi käyttää kahteen viikkoon ennen näytteenottoa: **vismuttivalmisteita** (mm. Tannocon, Pylorid ja De-Nol) tai **protonipumpun inhibiittoreita** (mm. Lanzo®, Losec®, Nexium®, Omeprazol, Pariet®, Somac®, Zolt®). **Antibiootihoidosta tulee olla kulunut vähintään neljä viikkoa.**



Saatte näytepurkin lähimmästä laboratorion toimipisteestä tai terveysasemalta.

1. Ulostakaa esim. kertakäyttölautaselle tai muuhun puhtaaseen astiaan.
2. Ottakaa ulostenäyte näyteputken korkkiin kiinnitetyllä lusikalla. Näytettä tulisi olla n. puoli purkillista.
3. Virtsan joutumista näytteeseen tulee välttää.
4. Kun näyte on putkessa, **kierrekorkki suljetaan tiiviisti. Vuotaneita näytepurkkeja ei voida tutkia.**
5. Sulje näyte muovipussiin (Minigrip tai vastaava).
6. Jos käytettävissäsi on tutkimustarra, varmista, että siinä olevat henkilötietonne ovat oikeat ja liimatkaa tarra näyteputkeen. Jos tarraa ei ole, kirjoittakaa putkeen vedenkestävällä tussilla nimenne ja henkilötunnuksenne sekä näytteenottopäivämäärä.

Näytteen säilytys ja toimitus laboratorioon

Näytettä säilytetään jääkaappilämpötilassa ja se tulee toimittaa samana päivänä lähimpään laboratorion toimipisteeseen.