



Laaduntarkkailu		easy CRP	wrCRP	wrCRP+Hb	CRP	CRP+Hb	CRP (101)
Keskitaso (~25 mg/l)	153764 QuikRead go CRP Control	UUSI	✓	✓	✓	✓	
Korkea taso (~75 mg/l)	68296 QuikRead CRP Control				✓	✓	✓
Matala taso (<2.5 mg/l)	153763 QuikRead go CRP Control High	UUSI	✓	✓	✓	✓	
	153765 QuikRead go CRP Control Low	UUSI	✓	✓	✓		
	68257 Ultrasensitive CRP Control			✓	✓		
Hb (<125 g/l)	153656 QuikRead go Hb 10 µl Control			✓			
	141154 QuikRead go Hb Control					✓	

✓ Suositellaan
✓ Sopiva

Suosittelemme
kontrollien
säännöllistä
käyttöä.

HbA1c



154520 QuikRead go HbA1c Control Set

UUSI

iFOBT



06027 QuikRead FOB Positive Control

152390 QuikRead go iFOBT Control Quantitative

Strep A



Strep A positiivinen ja negatiivinen kontrolli
(sisältyy pakkaukseen)

QuikRead go®

Tilaukset: tilaukset@aidian.fi

www.aidian.fi / www.quikread.com / www.tackleamr.com

QuikRead go -kontrollien käyttö

Yleistä tietoa

Kaikki QuikRead go -kontrollit ovat käyttövalmiita.

Käsittele kontrollia kuten mitä tahansa potilasnäytettä ja suorita testaus kontrollimittauksella, jolloin tulos tallentuu kontrollitiedostoon.

Sekoita hyvin, sillä ravistelu saattaa aiheuttaa ilmakuplia.

Huomioi viimeinen käyttöpäivä, säilytyslämpötila ja avatun kontrollin säilyvyys.

Anna kontrollin stabiloitua huoneenlämmössä ennen käyttöä. Poikkeusena HbA1c-kontrollit, jotka voidaan käyttää jääräappilämpöisinä.

Tutustu käyttöohjeisiin saadaksesi lisätietoja.

Säilytys

	Avaamaton kontrolli	Avattu kontrolli
CRP-kontrollit	2–8°C	2–8°C: 2 kuukautta
Hb-kontrollit	2–8°C	2–8°C: 1 kuukausi
HbA1c-kontrollit	2–8°C	2–8°C: 50 päivää
FOB positive control	2–8°C	2–8°C: viimeiseen käyttöpäivään asti
iFOBT quantitative -kontrolli	2–8°C	2–8°C: 1 kuukausi
Strep A -kontrolli	2–25°C	2–25°C: 12 kuukautta

Sample collector -näytteenotinta käyttävät testit

- Ota näyte asettamalla kärki hieman nesteen pinnan alle
- Tarkista, että kapillaariosa on täynnä
- Ota uusi näyte, mikäli näytteenottimessa näky ilmakuplia tai ylimääräistä kontrolliliuosta
- Älä pyyhi näytteenotinta



Kapillaaria käyttävät testit

- Täytä kapillaari valkoiseen "stopperiin" saakka
- Varmista, ettei kapillaarissa ole ilmakuplia
- Muista pyyhkiä kapillaari



Näyteputkea käyttävät testit

- Täytä pakauksessa olevan pipetin kärki alimmiseen palkeeseen saakka iFOBT quantitative -kontrolliliuoksella
- Varmista, ettei pipetissä ole ilmakuplia
- Tyhjennä pipetti kyvettiin puristamalla yläosan paljetta
- Käytä näytteenä kaksi (2) tippaa FOB Positive FOB Positive -kontrolliliuosta kolmen (3) esilaimennetun ulostenäytetilan sijaan



Näytteenottotikkua käyttävät testit

- Lisää kaksi (2) tippaa kontrolliliuosta uuttoputkeen, jossa on näyttenottotikku

