

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

7.8.2023

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

OHJEEN KÄYTÖSTÄ

Ohjetta tulee soveltaa hoitoyksikön toiminnan luonteen mukaisesti.

Ohje on ns. pikaohje, josta näkee nopeasti tarvittavat eristykseen liittyvät toimenpiteet

- tämä ohje ei korvaa infektio- ja mikrobikohtaisia ohjeita
- epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä esihenkilöön ja tarvittaessa hygieniahoitajaan

Lähihoitotilanne:

- fyysinen kontakti potilaaseen
- potilaan lähiympäristöön (alle 1m, myös siivouksessa)
- lääkärin tutkimus
- erilaiset hoito- ja terapiatilanteet

Eristys- ja varotoimikortit

- Eristys- ja varotoimikortteja käytetään varotoimi- ja eristysluokkakortit sairauksien mukaisesti sairaalaosastolla ohjeen mukaan. Varotoimikortit laitetaan esille heti kun on epäilyt eristystarpeesta.

HUOM!

- Jos tieto eristettävästä potilaasta saadaan etukäteen, huone tyhjennetään tarpeettomasta tavarasta
- Potilashuoneita ei varusteta ylimääräisellä tavaramäärällä.
- Huoneen loppusiivouksessa poistetaan kontaminoituneet ja avatut hoitotarvikkeet (esim. haavataitokset). Hoitohenkilökunnan toimesta poistetaan kaapeista ne tuotteet/tarvikkeet, joita on käsitelty ja kosketeltu. Avaamattomia pakkauksia ei tarvitse hävittää, ne voidaan pyyhkiä pintadesinfektioaineella
- Tiedotetaan kaikille yhteistyötahoille
- Jos yksikössä on käytössä vetyperoksidikuivasumulaite (Nocospray) tai desinfioiva sumutepatruuna (TECcare), loppusiivouksen jälkeen tyhjä huone voidaan käsitellä joko laitteella tai patruunalla. Huoneen voi ottaa käyttöön käsittelyn jälkeen

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

7.8.2023

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Eristys	Suojautuminen/Käsihygienia	Siivous / Desinfektio	Pyykki / Desinfektio	Jätteet / Muuta
<p>Suojaeristys *immuunipuutteiset potilaat</p> <p>Potilashuoneen oveen laitetaan suojaeristyskortti</p> <p>Akuuttia infektiota sairastavat eivät osallistu potilaan hoitoon tai huoneen siivoukseen</p> <p>Ruokailu: Ei tuoresalaatteja, pastöroimattomia tuoremehuja, kotikaljaa, kotisimaa</p> <p>kuumentamattomia pakastemarjoja, yrttimausteseoksia, pähkinöitä, kuorimattomia hedelmiä tai vihanneksia</p> <p>Ei leikkokukkia tai ruukkukasveja potilas huoneeseen</p>	<p>Suojakäsineitä käytetään potilaskosketuksessa</p> <p>Lähihoidossa suositellaan käytettävän lisäksi suojaesiliinaa tai -takkia</p> <p>Huolellinen käsien desinfektio</p>	<p>Siivotaan ensimmäisenä, normaalisiivous, mikrokuitusiivouspyyhkeet, huonekohtaiset siivousvälineet</p> <p>Taso-, kosketus- ja lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 % tai Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p>	<p>Normaali käytäntö</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö: 1. ensisijaisesti lämpödesinf. 2. pintadesinfektio Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Easydes, TECcare CONTROL pyyhe</p> <p>Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 %, Easydes, TECcare CONTROL pyyhe</p>	<p>Normaalia yhdyskuntajätettä</p> <p>Hoitoyksikkö siirroissa avatut hoitotarvikepakkaukset laitetaan potilaan mukaan, harkinnan mukaan</p>

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

7.8.2023

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Infektio / Eristys	Suojautuminen / Käsihygienia	Siivous / Desinfektio	Pyykki / Desinfektio	Jätteet / Muuta
<p>Kosketusvarotoimet</p> <p>MRSA</p> <p>MDR-Acin/MDR-Aci (moniresistentti acinetobakteeri)</p> <p>VRE</p>	<p>Huoneen siivouksessa suojakäsineet, potilaspaikan siivouksessa ja purkamisessa käytetään suojakäsineitä ja hihallista esiliinaa</p> <p>Kaikissa lähihoitotilanteissa käytetään suojakäsineitä ja hihallista esiliinaa tai suojatakkaa</p> <p>Suu-nenäsuojusta käytetään, kun on vaara roiskeista</p> <p>Huolellinen käsien desinfektio</p>	<p>Siivotaan viimeisenä, normaali siivous, mikrokuitusiivous-pyyhkeet (jos käytössä) tai kertakäyttöiset siivouspyyhkeet sekä huonekohtaiset siivousvälineet</p> <p>Taso-, kosketus- ja lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 % tai Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p>	<p>Ei tartuntavaarallista, mutta kerätään eristyshuoneessa pyykkipussiin</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö:</p> <ol style="list-style-type: none"> ensisijaisesti lämpödesinf. pintadesinfektio Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Easydes, TECcare CONTROL pyyhe <p>Viihdytysvälineet:</p> <p>pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 %, Easydes, TECcare CONTROL pyyhe</p>	<p>Normaalia yhdyskuntajätettä</p> <p>Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka viedään heti suurempaan lajitteluun</p> <p>Avatut hoitotarvikepakkaukset annetaan potilaan mukaan</p> <p>Tilan voi ottaa käyttöön heti loppusiivouksen jälkeen</p>
<p>ESBL <i>Escherichia Coli</i> (E.Coli)</p> <p>tavanomaiset varotoimet. Poikkeuksena hematologiset potilaat, joita hoidetaan kosketusvarotoimia noudattaen, jos hoidossa huomioitava riski on voimassa.</p>				

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

7.8.2023

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Eristys	Suojautuminen / Käsihygienia	Siivous / Desinfektio	Pyykki / Desinfektio	Jätteet / Muuta
<p>Kosketusvarotoimet (Kosketusvarotoimet –E)</p> <p>ESBL</p> <p>Klebsiella pneumoniae</p> <p>CPE = Karbapenemaasia tuottavat gramnegatiiviset sauvabakteerit</p> <p>MDRPA/MDR-Pseu =moniresistentti Pseudomonas aeruginosa</p> <p>Candida auris</p>	<p>Huoneen siivouksessa suojakäsineet, potilaspaikan siivouksessa ja vuoteen purkamisessa käytetään suojakäsineitä ja hihallista esiliinaa</p> <p>Kaikissa lähihoitotilanteissa käytetään suojakäsineitä ja -esiliinaa tai hihallista esiliinaa tai suojatakkaa</p> <p>Suu-nenäsuojusta käytetään, kun on vaara roiskeista</p> <p>WC tilojen vesikalusteiden kloorauksessa suojautuminen: Katso erillinen ohje taulukon lopussa.</p> <p>Huolellinen käsien desinfektio</p>	<p>Siivotaan viimeisenä, kertakäyttöiset siivouspyyhkeet sekä huonekohtaiset siivousvälineet, käytetään kosteaa menetelmää</p> <p>Kosketus- ja tasopinnat pyyhitään klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3.5 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p> <p>Kuivien tilojen lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Suihkupäät, letkut ja pidikkeet puhdistetaan päivittäin käsienspesualtaan pesun yhteydessä</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 % tai Erisan Oxy+ 2 %, käyttövalmis TECcare CONTROL</p>	<p>Tartuntavaarallista Pyykki kerätään huoneessa suoraan pesussa aukeavaan muovipussiin, joka laitetaan keltaiseen kankaaseen pyykkipussiin</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö: 1. ensisijaisesti lämpödesinf. 2. pintadesinfektio Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Easydes, TECcare CONTROL pyyhe</p> <p>Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Easydes, TECcare CONTROL pyyhe</p>	<p>Normaalia yhdyskuntajätettä. Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka vietään heti suurempaan lajitteluun</p> <p>Loppusiivous kosteat tilat: kosketus-, tasopinnat ja lattiat klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3.5 %</p> <p>WC-tilan vesikalusteiden klooraus (loppusiivouksessa), suihkupäät ja -letkut pestään huuhteludesinfektiopesukoneessa (tai kemiallinen desinfektio) kerran viikossa ja eristyksen loputtua. Katso erillinen ohje taulukon lopussa.</p> <p>Tilan voi ottaa käyttöön heti loppusiivouksen jälkeen</p> <p>Pitkäaikaishoidon osalta otetaan yhteyttä hygieniahoitajaan</p>

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

7.8.2023

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Eristys	Suojautuminen/Käsihygienia	Siivous / Desinfektio	Pyykki / Desinfektio	Jätteet / Muuta
<p>Kosketusvarotoimet (Kosketusvarotoimet - vatsatauti)</p> <p>Epäily tai todettu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clostridium Difficile • Norovirus • Rotavirus • Adenovirus <p>Epidemiatilanteessa ohjeita tarkennetaan</p>	<p>Suojaimet puetaan ennen huoneeseen menoa. Kaikki suojaimet riisutaan potilashuoneessa ja laitetaan jäteastiaan</p> <p>Huoneen, potilaspaikan siivouksessa ja purkamisessa käytetään suojakäsineitä ja hihallista esiliinaa tai suojatakkia, eritteitä poistettaessa suu-nenäsuojusta</p> <p>Kaikissa lähihoitotilanteissa käytetään aina suojakäsineitä ja hihallista esiliinaa tai suojatakkia sekä suu-nenäsuojusta, kun vaara roiskeista ja siivottaessa eritteitä</p> <p>Huoneesta poistuttaessa huolellinen käsien pesu vedellä ja saippualla sekä käsien desinfektio</p>	<p>Siivotaan viimeisenä, normaali siivous sekä taso- ja kosketuspintojen desinfektio, kertakäyttöiset siivouspyyhkeet ja huonekohtaiset siivousvälineet</p> <p>Huoneen ja wc:n kosketuskohdat desinfioidaan päivittäin: klooriyhdiste 1000 ppm tai Oxivir plus 15 %, Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p> <p>Lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Suihkupäät, letkut ja pidikkeet puhdistetaan päivittäin käsiensuoltaan siivouksen yhteydessä</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 15 % tai Erisan Oxy+ 2 %, käyttövalmis TECcare CONTROL</p>	<p>Tartuntavaarallista</p> <p>Pyykki ja tekstiiliväiverhot laitetaan huoneessa suoraan liukenevaan pyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen kankaaseen pyykkipussiin</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ensisijaisesti lämpödesinf. 2. pintadesinfektio Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Easydes, TECcare CONTROL pyyhe <p>Viihdytysvälineet:</p> <p>pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir plus 15 %, TECcare CONTROL pyyhe, (Easydes ei tehoa)</p>	<p>Normaalia yhdyskuntajätettä</p> <p>Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka viedään heti suurempaan lajitteluun</p> <p>Desinfioiva eristys huoneen loppusiivous, kun sairastuneet potilaat ovat poistuneet tai potilaan oireiden loppumisesta on kulunut vähintään 48 tuntia</p> <p>Suihkupäät ja -letkut pestään huuhteludesinfektiopesukoneessa (tai kemiallinen desinfektio) kerran viikossa ja eristyksen loputtua (kts. erillinen ohje taulukon lopussa)</p> <p>Eristyksen loputtua eristys huoneessa avatut hoitotarvike- ja suojainpakkaukset hävitetään</p> <p>Tilan voi ottaa käyttöön heti loppusiivouksen jälkeen</p>

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

7.8.2023

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Infektio / Eristys	Suojautuminen / Käsihygienia	Siivous / Desinfektio	Pyykki / Desinfektio	Jätteet / Muuta
<p>Kosketusvarotoimet</p> <p>Runsaasti erittävä haava- tai ihoinfektio, vyöruusu</p> <p>Pikkulapsilla: hengitystieinfektiot, enterovirusinfektiot</p> <p>Suolistoinfektiot vaippaikäisillä ja inkontinenteilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> EHEC (1 hengen huone muillakin, jos mahdollista) Giardia lamblia Kampylobakteeri Kryptosporidium Salmonella Shigella, Yersinia <p>Märkärupi</p>	<p>Huoneen siivouksessa suojakäsineet, potilaspaikan siivouksessa ja purkamisessa käytetään suojakäsineitä ja hihallista esiliinaa</p> <p>Kaikissa lähihoitotilanteissa käytetään suojakäsineitä ja hihallista esiliinaa tai suojatakkaa</p> <p>Suu-nenäsuojusta käytetään, kun on vaara roiskeista</p> <p>Huolellinen käsien desinfektio</p>	<p>Siivotaan viimeisenä, normaali siivous, mikrokuitusiivous-pyyhkeet (jos käytössä) tai kertakäyttöiset siivouspyyhkeet sekä huonekohtaiset siivousvälineet</p> <p>Taso-, kosketus- ja lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 % tai Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p>	<p>Ei tartuntavaarallista, mutta kerätään eristyshuoneessa pyykkipussiin</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö:</p> <ol style="list-style-type: none"> ensisijaisesti lämpödesinf. pintadesinfektio Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Easydes, TECcare CONTROL pyyhe <p>Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 %, Easydes, TECcare CONTROL pyyhe</p>	<p>Normaalia yhdyskuntajätettä</p> <p>Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka viedään heti suurempaan lajitteluun</p> <p><u>Avatut</u> hoitotarvikepakkaukset annetaan potilaan mukaan</p> <p>Kosketusvarotoimet oireiden ajan</p> <p>Tilan voi ottaa käyttöön heti loppusiivouksen jälkeen</p>

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

7.8.2023

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Infektio / Eristys	Suojautuminen/Käsihygienia	Siivous / Desinfektio	Pyykki / Desinfektio	Jätteet / Muuta
<p>Ilmaeristys</p> <p>Tartuttava tuberkuloosi</p> <p>Epäily tai todettu</p> <ul style="list-style-type: none"> • keuhko- tai kurkunpää tuberkuuloosi, yskösvärjäyspositiivinen • MDR-tuberkuloosi • XDR-tuberkuloosi 	<p>Kaikki huoneeseen menevät käyttävät FFP3 -hengityksensuojainta</p> <p>Huoneen, potilaspaikan siivouksessa ja purkamisessa käytetään suojaimia tavanomaisten varotoimien mukaan</p> <p>Kaikissa lähihoitotilanteissa käytetään suojaimia tavanomaisten varotoimien mukaan</p> <p>Huolellinen käsien desinfektio</p> <p>Potilas käyttää suu-nenäsuojusta siirtotilanteissa</p>	<p>Siivotaan viimeisenä, normaali siivous, mikrokuitusiivous-pyyhkeet (jos käytössä) tai kertakäyttöiset siivouspyyhkeet ja huonekohtaiset siivousvälineet</p> <p>Taso-, kosketus- ja lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 % tai Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p>	<p>Ei tartuntavaarallista, mutta kerätään eristyshuoneessa pyykkipussiin</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ensisijaisesti lämpödesinf. 2. pintadesinfektio Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Easydes, TECcare CONTROL pyyhe <p>Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 %, Easydes, TECcare CONTROL pyyhe</p>	<p>Normaalia yhdyskuntajätettä</p> <p>Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka vietään heti suurempaan lajitteluun</p> <p>Eristyksen kesto vaihtelee ja siitä päättää hoitava lääkäri</p> <p>Avatut hoitotarvikepakkaukset laitetaan potilaan mukaan hoitoyksikkö siirroissa</p> <p>Tilan voi ottaa käyttöön heti loppusiivouksen jälkeen</p>

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

7.8.2023

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Eristys	Suojautuminen/Käsihygienia	Siivous / Desinfektio	Pyykki / Desinfektio	Jätteet / Muuta
<p>Pisara- ja kosketusvarotoimet</p> <p>Pikkulapsilla ja immuunipuutteisilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeno-, • metapneumo- ja rinovirus • parainfluenssa • RSV 	<p>Huoneen, potilaspaikan siivouksessa ja purkamisessa käytetään suojaimia tavanomaisten varotoimien mukaan</p> <p>Kaikissa lähihoitotilanteissa käytetään suojaimia tavanomaisten varotoimien mukaan</p> <p>Eritteitä poistettaessa käytetään suu-nenäsuojusta</p> <p>Huolellinen käsien desinfektio</p>	<p>Siivotaan viimeisenä, normaali siivous, mikrokuitusiivous-pyyhkeet (jos käytössä) tai kertakäyttöiset siivouspyyhkeet ja huonekohtaiset siivousvälineet</p> <p>Taso-, kosketus- ja lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 % tai Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p>	<p>Ei tartuntavaarallista, mutta kerätään eristyshuoneessa pyykkipussiin</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ensisijaisesti lämpödesinf. 2. pintadesinfektio Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Easydes, TECcare CONTROL pyyhe <p>Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 %, Easydes, TECcare CONTROL pyyhe</p>	<p>Normaalia yhdyskuntajätettä</p> <p>Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka viedään heti suurempaan lajitteluun</p> <p>Avatut hoitotarvikepakkaukset laitetaan potilaan mukaan</p> <p>Tilan voi ottaa käyttöön heti loppusiivouksen jälkeen</p>

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

7.8.2023

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Eristys	Suojautuminen/Käsihygienia	Siivous / Desinfektio	Pyykki / Desinfektio	Jätteet / Muuta
<p>Pisaravarotoimet</p> <p>Influenssa</p> <p>epäillyt ja todetut</p> <p>Eristystä jatketaan 7 vrk kautta oireiden alusta tai 5 vrk viruslääkityksen aloittamisesta</p> <p>Yskimishygienia opastus potilaalle</p> <p>Epidemiatilanteessa ohjeita tarkennetaan</p>	<p>Kaikissa tutkimus- ja hoitotilanteissa sekä huoneen- ja potilaspaikan siivouksessa (lähikontakti alle 1 m)</p> <p>suojakäsineet suu-nenäsuojus tarvittaessa suojaesiliina tai hihallinen esiliina tai suojatakki</p> <p>Huolellinen käsien desinfektio</p> <p>Aerosoleja tuottavissa toimenpiteissä esim. liman imeminen hengitysteistä käytetään FFP3 hengityksensuojainta</p>	<p>Siivotaan viimeisenä, normaali siivous, mikrokuitusiivous-pyyhkeet (jos käytössä) tai kertakäyttöiset siivouspyyhkeet ja huonekohtaiset siivousvälineet</p> <p>Taso-, kosketus- ja lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %</p>	<p>Ei tartuntavaarallista, mutta kerätään eristyshuoneessa pyykkipussiin</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö:</p> <ol style="list-style-type: none"> ensisijaisesti lämpödesinf. pintadesinfektio Oxivir plus 3,5 % tai Easydes, TECcare CONTROL pyyhe, Erisan Oxy+2 %, <p>Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: Oxivir plus 3,5 %, Easydes, TECcare CONTROL pyyhe, Erisan Oxy+ 2 %</p>	<p>Normaalia yhdyskuntajätettä</p> <p>Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka viedään heti suurempaan lajitteluun</p> <p>Avatut hoitotarvikepakkaukset laitetaan potilaan mukaan</p> <p>Huonesijoittelu osastolla:</p> <ol style="list-style-type: none"> oma huone jos useita potilaita sijoitus samaan huoneeseen, jos I tai II ei mahdollista etäisyys viereiseen potilaaseen vähintään yksi metri

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

7.8.2023

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Eristys	Suojautuminen/Käsihygienia	Siivous / Desinfektio	Pyykki/Desinfektio	Jätteet/Muuta
<p>Pisaravarotoimet COVID-19 epäily/todennettu</p> <p>Varotoimet voidaan lopettaa, kun potilas on ollut oireeton 48 h ja oireiden alusta on kulunut 5-14 vrk. Syvästi immuunipuutteisen potilaan varotoimiaika 20vrk.</p> <p>Yskimishygienia opastus potilaalle</p> <p>Epidemiatilanteessa ohjeita tarkennetaan</p>	<p>Lyhyet käynnit huoneessa Kirurginen suunenä-suojus</p> <p>Pitkäaikaisessa lähihoidossa, ja aerosoleja tuottavissa toimenpiteissä FFP2/ FFP3 hengityksensuojain - suojalasit (sanka + visiiri) tai kokokasvovisiiri - pitkäihainen suojaesiliina tai suojatakki - suojakäsineet</p> <p>Päivittäissiivouksessa käytetään yllä olevia suojaimia.</p> <p>Loppusiivouksessa riittää muiden suojainten lisäksi kirurginen suunenä-suojus.</p> <p>Potilashuoneen siivous kerran päivässä</p> <p>Huolellinen käsien desinfektio</p>	<p>Siivotaan viimeisenä Siivousvälineet ja aineet: -huonekohtaiset siivouspyyhkeet ja -välineet -desinfioiva puhdistusaine</p> <p>Kosketus- ja tasopinnoille Klooria käytettäessä kertakäyttöpyyhe, Oxivir plus ja TECcare + mikrokuitupyyhe</p> <p>Lattiapinnan pyyhintä: Heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Suihkupäät, letkut ja pidikkeet puhdistetaan päivittäin ja eristyksen päätyttyä (katso ohje lopussa).</p> <p>Siivousvälineet, desinfioidaan ylläpitossiivouksessa</p> <p>Loppusiivous: Kosketus- ja tasopinnot Teccare, Oxivir plus 3,5 %, Erisan Oxy+ 2%. Lattiapinnat heikosti emäksinen puhdistusaine</p>	<p>Ei tartuntavaarallista, normaali käytäntö Kerätään eristys huoneessa pyykkipussiin ja viedään suoraan isompaan lajitteluun</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö: 1. ensisijaisesti lämpödesinf. 2. pintadesinfektio Oxivir plus 3,5 % tai Easydes, TECcare CONTROL pyyhe, Erisan Oxy+2 %</p> <p>Eritetahra: kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %</p> <p>Viihdytysvälineet: pintadesinfektio valmistajan ohjeen tai materiaalin vaatimusten mukaan: Oxivir plus 3,5 %, Easydes, TECcare CONTROL pyyhe, Erisan Oxy+ 2 %</p>	<p>Jätteet ovat normaalia yhdyskuntajätettä</p> <p>Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka viedään heti suurempaan lajitteluun</p> <p>Tekstiiliväliiverhot vaihdetaan, kertakäyttöiset väliiverhot huolletaan ohjeen mukaisesti eristyksen loputtua</p> <p>Tilan voi ottaa käyttöön heti siivouksen jälkeen</p>

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

7.8.2023

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Eristys	Suojautuminen/Käsihygienia	Siivous / Desinfektio	Pyykki / Desinfektio	Jätteet / Muuta
<p>Pisaravarotoimet</p> <p>Meningiitti</p> <p>Epäily tai todettu</p> <ul style="list-style-type: none"> • meningokokki • Haemophilus influenzae <p>Eristyksen kesto 24 tuntia tehokkaan hoidon alusta</p>	<p>Huoneen, potilaspaikan siivouksessa ja purkamisessa käytetään suojaimia tavanomaisten varotoimien mukaan</p> <p>Kaikissa lähihoitotilanteissa käytetään suojaimia tavanomaisten varotoimien mukaan</p> <p>Eritteitä poistettaessa käytetään suu-nenäsuojusta</p> <p>Huolellinen käsien desinfektio</p>	<p>Siivotaan viimeisenä, normaali siivous, mikrokuitusiivous-pyyhkeet (jos käytössä) tai kertakäyttöiset siivouspyyhkeet ja huonekohtaiset siivousvälineet</p> <p>Taso-, kosketus- ja lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 % tai Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p>	<p>Ei tartuntavaarallista, mutta kerätään eristyshuoneessa pyykkipussiin</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ensisijaisesti lämpödesinf. 2. pintadesinfektio Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Easydes, TECcare CONTROL pyyhe <p>Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 %, Easydes, TECcare CONTROL pyyhe</p>	<p>Normaalia yhdyskuntajätettä</p> <p>Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka viedään heti suurempaan lajitteluun</p> <p>Avatut hoitotarvikepakkaukset laitetaan potilaan mukaan</p> <p>Tilan voi ottaa käyttöön heti loppusiivouksen jälkeen</p>

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

7.8.2023

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Eristys	Suojautuminen/Käsihygienia	Siivous / Desinfektio	Pyykki / Desinfektio	Jätteet / Muuta
<p>Kosketusvarotoimet kunnes ensimmäisen hoitokerran loppumisesta on kulunut 24 tuntia</p> <p>Syyhy, täit, satiainen</p> <p>Karstasyyhypotilas hoidetaan yhden hengen huoneessa, kunnes molemmat hoitokerrat on toteutettu ja hoito todettu tehonneeksi</p> <p>Erillinen ohje: Syyhy ja sen tartuntojen leviämisen ehkäisy hoitoyksikössä</p>	<p>Huoneen ja potilaspaikan siivouksessa sekä purkamisessa käytetään suojakäsineitä ja hihallista esiliinaa tai suojatakkaa (suojakäsineet vedetään hihansuun päälle)</p> <p>Kaikissa tutkimus- ja hoitotilanteissa käytetään suojakäsineitä ja kertakäyttöistä suojatakkaa tai hihallista suojaesiliinaa, kun kosketaan potilaan ihoa, vaatteita ja vuodevaatteita. Paljaat ihonkohdat käsissä suojataan (suojakäsineet vedetään hihansuun päälle).</p> <p>Huoneesta poistuttaessa huolellinen käsien pesu vedellä ja saippualla sekä käsien desinfektio</p>	<p>Siivotaan viimeisenä, normaali siivous, kertakäyttöiset siivouspyyhkeet</p> <p>Taso-, kosketus- ja lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 % tai Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p>	<p>Tartuntavaarallista Pyykki ja tekstiiliväliverhot laitetaan huoneessa suoraan liukenevaan pyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen kankaaseen pyykkipussiin</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö Pesu ja desinfektio huuhteludesinfektiokoneessa (esim. Deko). Vesipesua kestävämmille välineille tehdään pintadesinfektio.</p> <p>Karstasyyhyssä huoneen kosketuskorkeudella olevat tekstiilit (pitkät ikkunaverhot ja väliverhot) ja tekstiilipintaiset huonekalut pestään huolellisesti</p>	<p>Normaalia yhdyskuntajätettä</p> <p>Vaatteet, pyyhkeet ja vuodevaatteet vaihdetaan ja pestään aina hoitoa seuraavana aamuna</p> <p>Eristyksen purusta tarkemmat ohjeet: pyykki-, vuode- ja muu tekstiilihuolto → kts ohje: Syyhy ja sen tartuntojen leviämisen ehkäisy hoitoyksikössä</p> <p>Eristyksen loputtua eristys huoneessa avatut hoitotarvike- ja suojainpakkaukset hävitetään</p> <p>Avaamattomat hoitotarvikkeet ym., joita ei voi puhdistaa suljetaan muovipussiin 3 vuorokaudeksi.</p>

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

7.8.2023

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Eristys	Suojautuminen/Käsihygienia	Siivous / Desinfektio	Pyykki / Desinfektio
Kosketusvarotoimet Luteet Kts. erillinen ohje: Luteiden torjunta	Suojakäsineet ja hihallinen esiliina ja suojatakki lähihoidossa, likapyykin/vuodetekstiilien käsittelyssä ja siivouksessa	Siivoustoimet tuholaistorjuntayrityksen ohjeen mukaan	Tartuntavaarallista Pyykki laitetaan huoneessa suoraan liukenevaan pyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen kankaaseen pyykkipussiin. Pussin päälle merkintä "lutikka-pyykki"
Jos tilassa on tai epäillään olevan lutikoita, torjuntatoimet tulee aloittaa heti. Ota yhteyttä hygieniahoitajaan, joka informoi asiasta kunnan tartuntataudeista vastavan hoitajan.			

Eristys	Suojautuminen/Käsihygienia	Siivous / Desinfektio	Pyykki / Desinfektio	Jätteet / Muuta
Ilmaeristys- ja kosketusvarotoimet Tuhkarokko tartunta/epäily Tartuttavaa: Hengitystie-eritteet Tartuttava aika 4 vrk ennen ihottumaa ja 4 vrk ihottuman jälkeen/oireisen ajan Vierailurajoitukset: raskaana olevat,	Kaikki potilashuoneeseen menevät käyttävät FFP3 -hengityksensuojainta Lähihoitotilanteissa käytetään hengityksensuojaimen lisäksi suojakäsineitä ja suojaesiliinaa tai suojatakkaa Huolellinen käsien desinfektio Huoneen siivouksessa käytetään FFP3-hengityksensuojainta, suojakäsineitä, esiliinaa tai suojatakkaa	Siivotaan viimeisenä , normaali siivous sekä taso- ja kosketuspintojen desinfektio, kertakäyttöiset siivousliinat ja huonekohtaiset siivousvälineet Lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine Eritetahrat , kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 % tai Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL	Ei tartuntavaarallista Tutkimus- ja hoitovälineistö: 1. ensisijaisesti lämpödesinf. 2. pintadesinfektio Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Easydes, TECcare CONTROL pyyhe Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 %, Easydes, TECcare CONTROL pyyhe	Normaalialueen yhdyskuntajätettä Varmista, että tuhkarokkoepäilystä/tartunnasta on asianmukaisesti tiedotettu. Tarkemmat ohjeet: Päivystyksen toimintaohje tuhkarokko epäilyssä Muuta: Huomioi erillisen tilan tarve potilaan vastaanottoa varten.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

7.8.2023

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

immuunipuutteiset ja rokottamattomat tartuttavana aikana				Potilaalle laitetaan suu- nenäsuojus siirtotilanteessa. Tuhkarokkoepäilyssä näytteet otetaan keskussairaalan päivystyksessä, näytteenottoaika sovitaan etukäteen soittamalla päivystyksen triagehoitajalle
--	--	--	--	--

SUIHKUPÄIDEN JA -LETKUJEN HUOLTO	<p>Suihkuletkujen sisäpinnoille sekä suihkupäihin muodostuu herkästi biofilmiä.</p> <ul style="list-style-type: none">• Puhdista suihkupäät, letkut ja pidikkeet päivittäissiivouksen yhteydessä.• Pese suihkupäät ja -letkut huuhteludesinfektiolaitteessa kerran viikossa sekä tehdessäsi loppusiivousta varoimihuoneeseen.• Käytä suihkupäiden ja -letkujen pesussa siihen suunniteltua telinettä, jossa vesi pääsee virtaamaan letkujen ja päiden läpi.• Mikäli telinettä ei ole käytössä, upota suihkupää ja letku kauttaaltaan Erisan Oxy+ 2 % liuokseen 30 min ajaksi tai kloori 2000 ppm 2 h ajaksi• Harjaa suihkupään ja letkun ulkoiset pinnat liotuksen aikana.• Lopuksi huuhtelee suihkupää ja letku runsaalla vedellä.
---	---

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

7.8.2023

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET**WC-TILAN VESIKALUSTEIDEN KLOORAUS**

Klooraus suoritetaan wc- ja kylpytilassa, mikäli potilas on ollut osastolla yön yli ja wc-tilaa on käytetty. Potilashuoneen tai sulkutilan käsiällasta ei ole tarpeen kloorata.

<p>Suojaimet:</p> <ul style="list-style-type: none">• nestettä läpäisemätön hihallinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina• kumisaappaat• hengityksensuojain FFP2• silmäsuojain (suojalasit tai visiiri)• nitrilisuojakäsineet (EN374)• vaihda käsineet, jos niihin tulee roiskeita• riisu käsineet välittömästi työskentelyn jälkeen <p>Tarvittavat välineet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Metallipöytä• Vuodesuoja ("kroonikkovaippa") metallipöydän suojaksi• Laimentamaton kloori• Mittakannu• Kieltokyltti/ SEIS-tarra wc:n oveen	<p>Toimintaohje:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pue suojaimet2. Kaada rauhallisin liikkein klooria erilliseen mittakannuun suojatun metallipöydän päällä3. Valuta kloori hitaasti vesikalusteiden sisäosiin<ul style="list-style-type: none">• WC-istuin: 4 dl yläreunoja pitkin• Lattiakaivo 2 dl yläreunoja pitkin• Käsiällä 1,5 dl - kaada kloori suoraan viemäriin, varo roiskeita altaan pohjalle (pyyhi mahdolliset roiskeet runsaalla vedellä kostutetulla paperilla, vaihda suojakäsineet)4. Sulje wc-tilan ovi huolellisesti ja laita oveen kieltokyltti/tarra5. Anna kloorin vaikuttaa 60min. Älä valuta Wc-tilan hanoista vettä ennen vaikutusajan loppumista.6. Riisu suojaimet7. Pura aputaso ja pyyhi pinnat <p>Wc-tilan loppusiivous kloorauksen jälkeen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pue suojaimet. FFP2-hengityksensuojainta käytetään wc-tilan siivouksen ajan.2. Vaihda ensimmäisenä puhtaat suihkuletkut ja -päät.
---	--

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

7.8.2023

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

	<p>3. Harjaa wc-pytyn ja lattiakaivon sisäosat omilla harjoillaan, aiemmin valutettu kloori riittää desinfektioaineeksi. Varo roiskeita.</p> <p>4. Riisu suojakäsineet, desinfioi kädet ja pue uudet suojakäsineet.</p> <p>5. Huuhtele käsiallas, wc-istuin ja lattiakaivo rauhallisesti käsisuihkulla, varo roiskeita.</p> <p>6. Tee tämän jälkeen wc- ja suihkutilan loppusiivous ohjeiden mukaisesti, voit käyttää Erisan Oxy+ 2 %:sta.</p> <ul style="list-style-type: none">• Käsialtaan pohja harjataan Erisan Oxy+ 2 % desinfektioaineella.• Wc-pytyn sisäosan sekä lattiakaivon harjausta ei tarvitse toistaa.
--	---