

Ulostenäyte helikobakteerin osoittamiseksi (F-HepyAg)

Tietyt lääkeaineet saattavat vaikuttaa testin tulokseen. Seuraavia lääkkeitä ei saisi käyttää kahteen viikkoon ennen näytteenottoa: **vismuttivalmisteita** (mm. Tannopon, Pylorid ja De-Nol) tai **protonipumpun inhibiittoreita** (mm. Lanzo®, Losec®, Nexium®, Omeprazol, Pariet®, Somac®, Zolt®).

Häätöhoidosta/antibioottihoidosta tulee olla kulunut vähintään neljä viikkoa.



Näytepurkin voit noutaa mistä tahansa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen laboratorion toimipisteestä.

1. Ulosta esim. kertakäyttölautaselle tai muuhun puhtaaseen astian. Ripuliuloste ei sovellu näytteeksi.
2. Ota ulostenäyte näytepurkin korkkiin kiinnitetyllä lusikalla. Näytettä tulisi olla n. puoli purkillista.
3. Vältä virtsan joutumista näytteeseen.
4. Kun näyte on purkissa, **sulje kierrekorkki tiiviisti. Vuotaneita näytepurkkeja ei voida tutkia.**
5. Jos käytettävissäsi on tutkimustarra, varmista, että siinä olevat henkilötietosi ovat oikeat ja liimaa tarra näytepurkkiin. Jos tarraa ei ole, kirjoita purkkiin vedenkestävällä tussilla nimesi ja henkilötunnuksesi sekä näytteenottopäivämäärä.
6. Sulje näytepurkki muovipussiin (Minigrip tai vastaava).

Näytteen säilytys ja toimitus laboratorioon

Toimita ulostenäyte vuorokauden kuluessa lähimpään Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen laboratorion toimipisteeseen aukioloajat huomioiden (samaan paikkaan, missä mahdolliset verinäytteet myös otetaan).

Mikäli et heti pääse tuomaan näytettä, se säilyy tarvittaessa jääkaappilämpötilassa 1 vrk ja se **ei saa** jäätyä.