

Seinäjoen keskussairaala
Fysiologian ja isotooppitutkimusten yksikkö

18.2.2026

Somatostatiinireseptoreiden SPET ja matala-annos-TT

Tutkimuksen tarkoitus

Hormonaalisesti aktiivisten kasvainten ja etäpesäkkeiden paikantaminen.

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimusta edeltävänä päivänä tulee olla nestemäisellä ruokavaliolla (esimerkiksi sosekeitot ja kiisselit) ja juoda noin 2 litraa nesteitä.

Tutkimusta edeltävänä iltana tulee aloittaa suoliston tyhjennys ulostuslääkkeillä. **Hae apteekista Toilax-yhdistelmä lääkepaketti.** Ota edeltävänä iltana klo 18.00 kaksi Toilax-tablettia ja tutkimusaamuna viimeistään klo 6.00 laitat Toilax-peräruiskeen.

Tutkimuspäivänä tulee olla syömättä. Vettä on syytä juoda 1–2 litraa.

Hoitava lääkäri antaa erilliset ohjeet oktreotidi-lääkehoidon mahdollisesta tauosta ennen tutkimusta.

Esteenä tutkimukselle on raskaus tai sen epäily.

Mikäli et selviydy itsenäisesti, saattaja on välttämätön.

Tutkimuksen suoritus

Kuvaus aloitetaan n. 2½ tuntia tutkimusaineen antamisen jälkeen. Odotusajan saa viettää vapaasti. Tutkimuksen kokonaiskesto on n. 4 tuntia.

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimuksen jälkeen kehossa on hieman radioaktiivisuutta, sen vuoksi on syytä kuvauspäivänä välttää lähikontaktia lasten ja raskaana olevien naisten kanssa. Imettävien äitien kannattaa varautua taukoon imetyksessä.

Tutkimuspaikka

Fysiologian ja isotooppitutkimusten yksikkö, Y-talo, hissi nro 48, 3. kerros.

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit ottaa yhteyttä isotooppiyksikköön, puh. 06 415 4090.
